



37701300

核准日期：2025年06月24日

核准日期：2025年06月24日

国外文献报道：

在大于12岁的儿童中报道的小于1%的不良作用如下：腹痛、消化不良、鼻窦炎、鼻炎、鼻窦炎、恶心和失眠。

在小于12岁的儿童中报道其他小于1%的不良作用还包括：食欲增加、腹泻、皮疹、烦躁、情绪不稳、多动、口味改变以及虚弱。

【禁忌】

对依巴斯汀或片剂中任何成分过敏的患者。

【注意事项】

对已知具有心脏病风险因素，例如心电图QT延长综合症、低钾血症患者以及正在服用具有延长QT间期的药物或CYP3A4酶抑制剂，例如酮唑和伊曲康唑等唑类抗真菌药物和红霉素等大环内酯类抗生素的患者应慎用依巴斯汀（参见【药物相互作用】）。

当利福平与依巴斯汀合用时也可能发生药代动力学相互作用（参见【药物相互作用】）。

严重肝损伤患者应慎用依巴斯汀（见【用法用量】）。

由于依巴斯汀在服用1至3小时后起作用，所以不适用于急性过敏的单药治疗。

对驾驶和机械操作能力的影响：一项旨在评估依巴斯汀对驾驶能力影响的试验显示，服用依巴斯汀每日剂量为18mg，但不影响驾驶能力。

生育能力

尚未获得依巴斯汀对生育能力的影响数据。